

Lancement de la saison

- Gérer le déprimage
- Envisager un sursemis

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 10/02 au 24/02	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	NM	NM
Zone Intermédiaire	12	5,9
Zone Sud	Nord Loire	8,0
	Sud Loire	6,7
MOYENNE REGION	15	7,0

Le début de pâturage a été permis assez tôt cette année avec des conditions de portance inédites. La pousse de l'herbe est plus importante dans le sud de la région où les températures sont plus douces.

Début des mesures de croissance la semaine prochaine pour la zone « Nord »



Gérer le déprimage

Le déprimage est le premier tour de pâturage des animaux, il a trois objectifs principaux :

- Retirer la biomasse résiduelle d'hiver afin de favoriser le tallage tout en apportant de la lumière au trèfle (hauteur sortie 4 à 5 cm).
- Créer un décalage entre les parcelles.
- Permettre un passage de pâturage dans les parcelles destinées à la fauche avant la montée de l'épi dans la gaine

Pour réussir son déprimage au vu de la sortie précoce des animaux, il est important de ne pas aller trop vite sur ses parcelles. Ceci permettra de créer un réel décalage entre les parcelles et assurera une hauteur suffisante dans les parcelles au début du premier cycle. On cherchera ainsi à finir son premier tour vers le début avril (entre le 25 mars et le 10 avril selon les zones climatiques).

Exemple : Sortie au 1^{er} mars en Sud 44 sur 20ha, on va viser une date de fin au 25 mars soit 0.8ha par jour pour le premier tour.

En fonction de la date à laquelle les animaux ont arrêté de pâturer à l'automne il peut y avoir plus ou moins d'herbe à aller pâturer dans les champs.

Si la hauteur d'herbe est raisonnable (<9cm herbomètre) à l'entrée. Pour assurer un temps par parcelle qui permet de ne pas finir trop vite son premier tour, il est conseillé d'utiliser un fil et ainsi diviser la

parcelle en autant que de jours à passer dans cette parcelle. Ne pas hésiter notamment à limiter le temps d'accès aux paddocks, par exemple sortir les animaux en fin de matinée et les rentrer en milieu d'après-midi.

Si la hauteur d'herbe à l'entrée de la parcelle est importante (>9cm herbomètre), on peut dès à présent passer à une distribution de l'alimentation à l'auge le soir tout en ayant un peu de refus à faire manger le matin avant de sortir. Ainsi les animaux auront plus d'appétit une fois arrivés au champ.

Dans tous les cas, on cherchera une hauteur sortie herbomètre à 4-5cm pour apporter de la lumière au trèfle.

Attention toutefois avec ces pâturages précoces : Les jours de gel peuvent poser des problèmes de tétanie d'herbage. Un apport de fourrage avant la mise à l'herbe et une complémentation en oxyde de magnésie peuvent prévenir ce risque.

Envisager un sursemis

Pour des prairies très dégradées par la sécheresse estivale en 2022, il est encore possible de réaliser un sursemis.

Faites un tour sur toutes les parcelles et repérez les endroits dégradés, avec des trous dans la végétation (>10% de la surface), sans adventices vivaces.



Exemple de couverture végétale propice au sursemis.

Après un déprimage ras (3 à 4 cm herbomètre), vous pourrez ainsi sursemer directement dans la prairie avant la mi-mars. Les doses à ressemer sont assez proches des doses de semis classique. Il est important de choisir des espèces et variétés agressives qui pourront résister à la concurrence de la prairie en place (trèfle blanc intermédiaire et/ géant, associé à des ray grass anglais et ou hybrides)

Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

**Chambre d'agriculture
Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr