




Valoriser l'herbe d'automne

- Respecter les temps de repousses
- Faire le point sur les adventices
- Semer les prochaines prairies

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 15 au 29/09	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	36	8,3
Zone Intermédiaire	17	7,4
Zone Sud	Nord Loire	13
	Sud Loire	22
MOYENNE REGION	19	7,8

La pousse de l'herbe reste limitée mais progresse un peu depuis 2 semaines. On observe que les hauteurs des parcelles retournent à la hausse. Etant donné les prévisions météo des 10 prochains jours, nous pouvons être optimiste sur la pousse de l'herbe, à condition d'avoir eu suffisamment d'eau sur le mois de septembre.



Respecter les temps de repousses

Malgré des températures qui vont être plutôt favorables, L'ensoleillement limite la pousse. Attention donc à ne pas revenir trop tôt dans les parcelles, et à sortir les animaux à temps pour ne pas surpâturer les prairies. Avec une croissance à 18kgMS/ha/j, il faut garder un cycle de repousse d'au moins 45 jours pour ne pas entamer les réserves de la prairie, et compromettre la reprise au printemps prochain. Le cycle de pâturage habituel peut donc s'allonger en finissant par les parcelles les plus portantes.

Pour les parcelles qui ont de la présence de rouille sur les feuilles, et qui n'ont pas été broyées en fin d'été, il est possible de faire passer plusieurs lots à la suite. L'important est de mettre une pression suffisante pour éliminer les feuilles de rouille et de ne pas laisser trop longtemps les animaux qui iront pâturer les petites repousses.

La repousse d'herbe d'automne est bonne ! Mais très tendre... Pour mieux la valoriser, pensez à compléter en fibres dans les rations.

Faire le point sur les adventices

En ce début d'automne, il est commun de revoir la floraison des chardons, par exemple, surveiller le stade bourgeonnement pour couper les pieds restants.

Nous sommes à la période où les possibles désherbages chimiques sont les plus efficaces dans les prairies. Avant de prendre la décision de traiter, il est important de faire un point sur le niveau d'infestation de la flore indésirable. Il est possible de classer les prairies sur 3 niveaux :

- Infestation d'adventices qui ne progresse pas : les mesures alternatives mises en place tout au long de l'année sont suffisante pour maîtriser cette flore.
- Infestation d'adventices qui progresse trop vite : les mesures alternatives mises en place ne suffisent plus. Ici, il faut se poser plusieurs questions : est-ce que la proportion d'adventices est trop importante par rapport aux fourragères ? Est-ce que les adventices sont seulement gênant mais si ça continue elles vont remplacer les espèces fourragères ? Dans le premier cas, une réintégration de la parcelle dans la rotation est peut-être à envisager. Dans le second cas, un désherbage chimique localisé peut-être envisagé. Cependant, les traitements chimiques font des trous dans les prairies : il est possible de faire un sursemis de prairiales (selon le produit utilisé pour éviter la rémanence de l'herbicide).
- Il y a des trous dans les prairies qui sont prêts à être colonisés : évaluer la flore présente et regarder dans ces trous la flore qui lève (graminées ? Légumineuses ? Diverses ?). Cette évaluation permettra d'imaginer la tête de la prairie au printemps !

Semer les prochaines prairies

Avec la date avancée, il est l'heure maintenant de faire les semis de prairies sous couvert, en fonction de l'état actuel des sols. Les sols sont encore chauds ce qui favorisent la levée. Attention cependant à ne pas le faire trop tard dans la saison et au travail du sol, les pluies de septembre nous l'ont démontré : les pluies peuvent arriver d'un coup, créant ainsi une battance de surface.

Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire

