


### Une mise à l'herbe délicate

- Gérer le déprimage
- Respecter les transitions alimentaires

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 23/02 au 01/03	Hauteur moyenne (cm)
<b>Zone Nord</b>	17	7,7
<b>Zone Intermédiaire</b>	25	7,2
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	15
	<b>Sud Loire</b>	15
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>17</b>	<b>8,5</b>

Les mesures de pousse de l'herbe commencent doucement cette année. Cette semaine nous remarquons que l'herbe est assez haute : les températures clémentes de cet hiver ont favorisé une pousse hivernale. Les stocks d'herbe sur pied sont donc plus importants que d'habitude.



## Gérer le déprimage

Le déprimage est le premier tour de pâturage des animaux, il a trois objectifs principaux :

- Ramasser la biomasse résiduelle d'hiver afin de favoriser le tallage tout en apportant de la lumière au trèfle (hauteur sortie 4 à 5 cm).
- Créer un décalage de pousse entre les parcelles.
- Permettre un passage de pâturage dans les parcelles destinées à la fauche avant la montée de l'épi dans la gaine.

Les pluies de ces dernières semaines n'ont pas été favorables à la portance des prairies de la région, ce qui n'a pas aidé à démarrer le pâturage. 2 cas de figures se présentent alors dans les exploitations :

### L'exploitation a moins de 30 ares/vaches et/ou a déjà pu commencer un déprimage

Pour réussir son déprimage, il est important de ne pas aller trop vite sur ses parcelles pour créer un réel décalage de pousse entre les parcelles et assurer une hauteur (et une densité) suffisante dans les parcelles au début du premier cycle. Il faut que les parcelles soient bien pâturées dès le déprimage car ce qui n'est pas consommé lors de ce 1<sup>er</sup> tour ne le sera pas après. Afin d'ajuster la vitesse du tour de déprimage, une technique serait d'aller voir sur la première parcelle de déprimage à la moitié du tour pour voir son stade : le deuxième feuille des graminées doit être en train de sortir.

### L'exploitation a plus de 30 ares/vaches et/ou n'a pas pu commencer son déprimage

L'objectif ici sera d'être opportuniste sur les sorties des animaux pour faire tout de même un déprimage. Il devient nécessaire de faire le tour des parcelles toutes les semaines pour vérifier la portance des prairies et ajuster au mieux ce premier tour de pâturage. Priorisez les parcelles

portantes pour la mise à l'herbe et ensuite celles dont la hauteur d'herbe est la plus importante. Avec une portance particulièrement limitante, ne pas hésiter à ne sortir que les lots les plus légers. Les parcelles destinées à être mises en maïs pourront servir pour attendre le retour de la portance sur le circuit.

Sur les parcelles sans portance qui ont du mal à ressuyer dans le mois, ne pas hésiter à les passer en fauche en avril : les animaux auront particulièrement de mal à pâturer ce stock d'herbe.

Si les animaux ont déjà pu commencer à déprimer quelques parcelles, il faut veiller à ne pas les faire repasser dessus avant que l'herbe ait atteint une hauteur d'herbe suffisante de 10-12cm.

## Respecter les transitions alimentaires

Comme toutes les transitions, la mise à l'herbe est à faire progressivement. La non-portance des parcelles va orienter le choix de sortie des animaux à des temps courts. Il est donc primordial de prendre d'autant plus de soin aux transitions alimentaires pour à la fois maximiser le ramassage de l'herbe par les animaux et limiter les tétanies d'herbage.

Avec la portance limitante, il ne faut pas hésiter à rediviser les paddocks pour diminuer le temps d'accès au pâturage. Le recours au fil avant peut se révéler très efficace pour assurer un bon ramassage de la biomasse tout en limitant de fortes variations d'ingestion (en quantité et en qualité) entre le premier et le dernier jour dans la parcelle.

<b>Kg MS herbe ingérée/heure d'accès</b>	<b>Temps d'accès/jour</b>
0,4	Pâturage jour + nuit (18-20h/jour)
1,5	8-9h/jour
2	4h/jour
2,5	2 x 3h/jour

*Ingestion d'herbe des vaches laitières au pâturage selon le temps d'accès (Source : INRA)*

Pour favoriser l'ingestion de l'herbe, il convient alors d'assurer un petit fond de panse fibreux avant la sortie des animaux (minimum de ration accessible). Une complémentation en magnésium, sous forme d'oxyde de magnésie est aussi préconisée en cas de températures plus froides ou de transition rapide. Ceci évitera la carence en magnésium pouvant conduire à de la tétanie d'herbage.

Pour des raisons sanitaires également, il est nécessaire de profiter des tours des parcelles pour vérifier les abreuvements. Il y a eu beaucoup d'eau cet hiver qui a probablement stagné dans les bacs. C'est le moment de les vider et de les nettoyer avant de mettre à l'herbe.

Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

**Chambre d'agriculture  
Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)  
**SEENOVIA** 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)

