

Bulletin pousse de l'herbe régional N°23 rédigé le 9/11/15

La pousse est stable, météo et croissance très favorable pour la saison!

La météo est souvent le facteur limitant pour valoriser l'herbe d'automne. Cette année, on joue les prolongations et ce n'est pas fini.

Dans ces conditions, il faut poursuivre le nettoyage et encore privilégier les parcelles les moins portantes tant que les conditions le permettent.

Un automne exceptionnel en croissance et en conditions de valorisation !

Si l'on regarde les résultats de croissance mesurée cet automne, on est de l'ordre de 0.5 à 1 T de MS de plus que d'habitude (cf. ci-contre). mis à part la zone nord, la pousse a été supérieure à 20 kgs pendant plus de 10 semaines.

Par ailleurs, les conditions météo ont été très bienveillantes, tant en humidité qu'en températures pour faire pousser, pâturer, et voir récolter de l'herbe.

De l'herbe de qualité à valoriser!


Pour garantir de bonnes valeurs et conditions de reprise au printemps, la végétation doit être autour de 5-8 cm avant l'hiver et pas au-delà. Certains ont déjà fait des fauches pour assurer une « remise à niveau » avant l'hiver. La qualité de cette herbe d'automne est bonne, voire excellente.

« Selon l'étude Valherbe faite par les chambres d'Agriculture des Pays de la Loire en 1997-1998, un ray-grass anglais/trèfle-blanc a une valeur de 0.94 UFL et de 142 g/kgMS PDIN à l'automne ». Pour preuve, cet automne un éleveur mayennais a réalisé un ensilage d'excellente qualité (0.94 UFL, 127 PDIN et 82 PDIE) avec une prairie multi-espèces pour un rendement de 1.5 T de MS/ha. Attention toutefois les conditions météo obligent à prendre beaucoup plus de temps pour le fanage (x2) pour garantir une qualité de conservation. Plus globalement, ces récoltes d'automne ont une conservation moins bonne, elles sont à faire consommer en priorité.

Les semis de prairies de fin août début septembre sont également bien développés et mériteraient (si ce n'est pas déjà fait) de se faire pâturer. Cela peut encore s'envisager tant que la météo reste clémente. Cependant, il est important de ne pas les dégrader par ce premier pâturage. Ce passage n'affectera pas le développement futur de la végétation.

Le pâturage hivernal pour continuer à réduire les coûts!

Il est possible de faire pâturer des animaux à besoins plus modérés durant l'hiver. Ce choix de conduite engendre une économie de stocks fourragers, de concentrés, de litière, et aussi plus globalement de travail (rabotage, paillage et distribution). Il est indispensable d'ajuster le chargement (0.5 à 0.8 UGB/ Ha) et de faire tourner pour éviter le piétinement. Attention de respecter les 2 mois de repos hivernal sur chacune des parcelles. Le choix des parcelles est primordial pour se mettre en conditions pour pouvoir le faire.



	Semaines 36-37	Semaines 38-39	Semaines 40-41	Semaines 42-43	Semaines 44-45	Rendement en T de MS/ha
Zone Nord	NR	41	19	10	11	1,2
Zone Intermédiaire	55	46	26	20	30	2,7
Zone Sud - Nord Loire	42	36	25	17	19	2,1
Zone Sud - Sud Loire	24	59	31	21	23	2,4

Il s'agit du dernier bulletin de cette année 2015. Rendez-vous l'an prochain et d'ici là, continuez à valoriser l'herbe...

Merci à toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin, et qui permettent la rédaction de ce bulletin. Merci en particulier aux élevages qui nous ouvrent leurs parcelles depuis le début de l'année ou plus.

Action partenariale : Chambres d'agricultures Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, BCSVC